

АННОТАЦИЯ

«ФУЗОБАКВЕЛТ»

лекарственное средство для животных

ОПИСАНИЕ

Готовое к использованию лекарственное средство для наружного применения, в виде жидкости от темно-коричневого до черного цвета с запахом дегтя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для лечения некробактериоза крупного рогатого скота и овец и копытной гнили овец.

СОСТАВ

Клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом, деготь березовый, медный купорос, функциональные и технологические компоненты (изопропиловый спирт, вода дистиллированная).

СВОЙСТВА

Обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т. ч. кислотоустойчивых и спорообразующих бактерий, а также плесневых грибов. Препарат активен в отношении *Fusobacterium necrophorum* и *Dichelobacter nodosus*.

При нанесении на поврежденные участки кожи и копытного рога при некробактериозе и копытной гнили животных глубоко проникает в пораженные ткани, проявляя бактерицидное, противовоспалительное действие, улучшает кровоснабжение тканей, подсушивает раны.

Побочного действия и противопоказаний не установлено.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяют наружно для лечения и профилактики некробактериоза крупного рогатого скота и овец и копытной гнили овец.

Перед применением емкость с препаратом необходимо интенсивно встряхнуть.

АННОТАЦИЯ

Пораженные участки конечностей животных обрабатывают наружно, нанося препарат кисточкой или ватно-марлевым тампоном и втирая его в раневые поверхности 1 раз в день в течение 10 суток, включая также копытца, межкопытную щель и подошву конечностей.

С профилактической целью применяют при плановой обрезке копыт у животных, однократно нанося препарат на обработанные поверхности.

Способы применения и меры безопасности подробно описаны в Инструкции по применению от 29 апреля 2009 г.

Форма выпуска: полимерные флаконы по 300 мл и 1,0 л.

Хранение: в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от -5°C до $+35^{\circ}\text{C}$.

Срок годности: 2 года со дня изготовления.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Учетная серия 37-2-11.8-3389 Регистрационный № ПВР-2-11.8/02362

от 29 апреля 2009 года срок действия до 29 апреля 2014 года
(дата) (дата)

Настоящее свидетельство выдано организации-производителю ООО «НПО
(заявитель)
«ВЕЛТ», Оренбургская область, г. Оренбург

о том, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона
«О лекарственных средствах»,

Фузобаквелт

(полное название лекарственного средства для животных)

в виде жидкости
(форма)

применяется для лечения и профилактики некробактериоза крупного рогатого
скота и овец и копытной гнили овец

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заместитель Руководителя

Россельхознадзора
(должность)



Н.А. Власов
(И.О. Фамилия)

Свидетельство о государственной регистрации
лекарственного средства для животных
№ ПВР-2-11.8/02362 от 29.04.2009 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Фузобаквелта для лечения и профилактики
некробактериоза крупного рогатого скота и овец
и копытной гнили овец
(ООО «НПО «ВЕЛТ», г. Оренбург)

Москва, 2009 г.

УДК 614.484 (083.131)

ББК 51.9я82

И72

Инструкция по применению Фузобаквелта для лечения и профилактики некробактериоза крупного рогатого скота и овец и копытной гнили овец (ООО «НПО «ВЕЛТ», г. Оренбург). М.: ООО «Издательский дом «ВЕЛТ», 2010 г. – 12 с.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Фузобаквелта для лечения
и профилактики некробактериоза
крупного рогатого скота и овец и копытной гнили овец
(ООО «НПО «Велт», г. Оренбург)

Исследования проведены и подтверждены научными отчетами в следующих учреждениях:

- ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К. И. Скрябина;
- ООО «НПО «ВЕЛТ».

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Фузобаквелт (Fuzobakvelt) – лекарственное средство для наружного применения в форме раствора, предназначенное для лечения некробактериоза крупного рогатого скота и овец и копытной гнили овец.

2. Фузобаквелт содержит в своем составе в качестве действующих веществ клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с карбамидом (10 %), деготь березовый (10 %) и медный купорос (5 %), и в качестве вспомогательных компонентов спирт изопропиловый и воду дистиллированную, а также технологические и функциональные компоненты.

3. По внешнему виду Фузобаквелт представляет собой жидкость от темно-коричневого до черного цвета ($pH\ 3,5 \pm 0,5$) с запахом дегтя. При отстаивании возможно расслоение жидкости на окрашенный в черный цвет верхний слой и бесцветный или зеленоватый, слегка опалесцирующий, нижний слой. После встряхивания жидкость приобретает однородную окраску.

4. Выпускают Фузобаквелт расфасованным по 300 см³ в полимерные или стеклянные флаконы и по 1 дм³ в полимерные бутылки соответствующей вместимости, закрытые крышкой с контролем первого вскрытия.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения средства, названия и содержания действующих веществ, объема средства в упаковке, надписи «Для животных», даты изготовления, срока годности, номера партии, условий хранения, мер предосторожности, номера государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия, обозначения СТО и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Фузобаквелт в закрытой упаковке организации-производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от - 5 °С до +35 °С.

Срок годности Фузобаквелта при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления. По истечении срока годности Фузобаквелт не должен применяться.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Фузобаквелт обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т. ч. кислотоустойчивых и спорообразующих бактерий, а также плесневых грибов. Препарат активен против *Fusobacterium necrophorum* и *Dichelobacter nodosus*.

При нанесении на поврежденные участки кожи и копытного рога при некробактериозе и копытной гнили животных Фузобаквелт глубоко проникает в пораженные ткани, проявляя бактерицидное, противовоспалительное действие, улучшает кровоснабжение тканей, подсушивает раны.

6. По степени воздействия на организм Фузобаквелт относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Не обладает сенсibiliзирующими и кумулятивными свойствами.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Фузобаквелт применяют наружно для лечения и профилактики некробактериоза крупного рогатого скота и овец и копытной гнили овец.

8. Перед проведением обработки копыта и копытца животных очищают от загрязнений и при необходимости подрезают копытный рог.

Перед применением емкость с Фузобаквелтом необходимо интенсивно встряхнуть.

9. Пораженные участки конечностей животных обрабатывают наружно, нанося препарат кисточкой или ватно-марлевым тампоном и втирая его в раневые поверхности 1 раз в день в течение 10 суток, включая также копытца, межкопытную щель и подошву конечностей.

Возможно применение Фузобаквелта в виде ножных ванн, заполняя препаратом емкости из любых материалов и прогоняя через них больных животных 1 раз в день в течение 10 суток.

10. С профилактической целью Фузобаквелт применяют при плановой обрезке копыт у животных, однократно нанося препарат на обработанные конечности.

11. Побочного действия при применении Фузобаквелта в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. Противопоказаний не установлено.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При использовании Фузобаквелта необходимо защищать кожу рук резиновыми перчатками и избегать попадания препарата на кожу и слизистые оболочки.

13. Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом.

14. При попадании Фузобаквелта на кожу его следует тотчас смыть струей проточной воды, при попадании в глаза – немедленно тщательно промыть их водой и обратиться к медицинскому работнику.

15. При попадании средства в желудок пострадавшему необходимо дать выпить несколько стаканов воды, затем принять 8–10 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать.

16. При появлении признаков отравления немедленно обратиться к медицинскому работнику.

17. Фузобаквелт следует хранить в местах, не доступных для детей.

